

la bande est complètement dépliée, on aperçoit un dessin en forme de V sur le vertex; ce dessin limite à sa partie inférieure une étroite saillie brillante située sur le premier tiers de la bande frontale à partir du vertex.

Cette bande blanche porte des traces de pubescence blanche. Yeux bruns. glabres. Épistome noir brunâtre.

Antennes noires à pubescence noire. Partie comprise entre les antennes et les palpes à pubescence blanc jaunâtre.

Joues à pubescence jaunâtre. Palpes brun noir à courte pubescence blanche, éparse; trompe noire à pubescence concolore.

Thorax et scutellum brun noir à pubescence latérale brune, pectus semblable. Abdomen noir, obconique, généralement glabre, portant quelques poils brun noir sur les bords latéraux et postérieurs des trois derniers segments; flancs et bord des quatre premiers segments à pubescence jaune doré.

Ventre noir à pubescence noire éparse, bord postérieur des segments à pubescence jaune.

Pattes noires en entier à pelotes noires.

Hanches à poils blancs épars, cuisses, tibias antérieurs et médians à pubescence blanchâtre sur la face externe, tibias postérieurs frangés de brun sombre.

Tarses médians et postérieurs armés de courts poils rouges à leur face interne.

Ailes d'un beau brun à nervures noires. cellule discoïdale un peu hyaline le long de sa nervure supérieure.

Balanciers bruns à tige noire.

NOTES SUR LES *TABANUS* RAPPORTÉS DE L'AFRIQUE TROPICALE.

PAR M. LE D^r BRUMPT.

PAR M. JACQUES SURCOUF, CHEF DE TRAVAUX
AU LABORATOIRE COLONIAL DU MUSÉUM.

Les diptères recueillis par M. le D^r Brumpt et donnés par lui au Muséum national d'histoire naturelle ont permis de contrôler les renseignements parfois insuffisants des voyageurs anciens pour qui une indication précise de localité n'avait qu'une importance secondaire.

Certaines espèces de Taons sont étroitement localisées et, vivant soit au bord des eaux, soit dans les montagnes, n'empiètent jamais sur des régions différentes; certaines, au contraire, possèdent une aire d'expansion extrêmement étendue et, comme le *Tabanus taniola* Pal-Beau, se rencontrent de

l'Est à l'Ouest de l'Afrique sur une profondeur de 10 degrés de chaque côté de l'Équateur.

L'exactitude des localités, la précision des époques de capture donnent à cette collection une importance toute spéciale que ne démentent pas le nombre et la qualité des insectes qui la composent.

Les Taons recueillis par M. Brumpt et faisant partie actuellement de la collection du Muséum appartiennent aux espèces suivantes :

- TABANUS AFRICANUS* ♀ Gray. — Dongou. Rivière Ouellé. Congo belge.
- T. FASCIATUS* ♀ Fabricius. — Entre Boumba et Balomba (fl. Congo), janvier 1903.
- T. BIGUTTATUS* ♀ Wiedemann. — Entre le Ouabi Chebeli et le Oueb, pays Somali.
- T. CANUS* ♀ Karsch. — Confluent de l'Oubanghi et du Congo, janvier 1903.
- T. UGANDE* ♀ Ricardo. — Nombreuses femelles provenant du lit du Dakoto (Ogaden), pays Somali au Sud de Harrar, juin 1901, et du confluent de l'Oubanghi et du Congo (janvier 1903).
- T. RUFIPES* ♀ Pal-Beau. — Quatre exemplaires de Mayomba (Congo français), janvier 1904.
- T. TOENIOLA* ♀ Pal-Beau. — Sainte-Marie-de-Bathurst. Gambie anglaise et lit du Dakoto (Ogaden). pays Somali au sud de Harrar. Juin 1901.
- T. CONGOIENSIS* ♀ Ric. — Mayomba. Congo français.
- T. THORACINUS* ♀ Pal-Beau. — Mayomba, 17 janvier 1904.
- T. COMBUSTUS* ♀ Bigot. — Mayomba, janvier 1904.
- T. PAR* ♀ Walk. — Donfilé sur le Nil. Enclave belge de Lada, septembre 1902.
- T. CONFORMIS* ♀ Walk. — Grand-Bassam. En ville, 4 octobre 1905. Mayomba, 22 septembre 1903. Massabi. Congo français, 21 septembre 1903.
- T. DITOENIATUS* ♀ Macq. — Entre l'Oued Chebeli et l'Oueb pays Somali. septembre 1901. Gambie anglaise. Sainte-Marie-de-Bethurst.
- T. GRATIS* ♀ Lœw. — Entre l'Oued Chebeli et l'Oueb, septembre 1901.
- T. LEI COSTOMUS* ♀ Lœw. — Lit du Dakoto (Ogaden, pays Somali au Sud de Harrar, juin 1901). Ces deux dernières espèces n'étaient connues que du Sud de l'Afrique et manquaient à la collection du Muséum.
- T. TESTACEIVENTRIS* ♀ Macq. — Rivière Mouhy au nord de Libreville (Gabon). 26 septembre 1903.

T. Brumpti nov. sp.

PANGOÏA MAGRETTI ♀ Bezzi. — Nombreux exemplaires provenant des rives du fleuve Omo, provinces méridionales de l'Abyssinie.

Tabanus Brumpti var. nov.

Je dédie cette variété à M. le Dr Brumpt, qui l'a rapportée des bords du Benoué.

Type : un exemplaire femelle, de la collection du Muséum.

Noir, abdomen bleuâtre, ailes hyalines, tibias rouges.

Longueur, 19 millimètres; envergure, 38 millimètres.

Tête grande, plus large que le thorax. Face brune avec une tomentosité brun jaunâtre et une pubescence brune, plus dense sur les joues. Barbe noirâtre. Palpes bruns à pubescence noire très dense sur le côté externe et leur donnant l'apparence d'être noirs; longs avec les parties basilaire et médiane peu renflées.

Antennes longues, minces, noirâtres; premier article rougeâtre, à pubescence dense d'un noir brillant, second rouge à pubescence noire épars, troisième à dent médiocre, allongé, recouvert d'une tomentosité blanchâtre.

Épistome et bande frontale de même couleur que la face, callosité frontale noirâtre, étroite, non saillante, non tangente aux côtés de la bande frontale, prolongée par une ligne étroite. Bande frontale étroite environ cinq fois aussi longue que large.

Thorax brun rougeâtre brillant, dessus glabre, côtés couverts de poils noirs; pectus brun rougeâtre à pubescence noirâtre. Scutellum de la couleur du thorax.

Abdomen court, épais, noir avec une tomentosité gris bleuâtre, à courte et rare pubescence noire sur les côtés de l'abdomen, plus dense sur les derniers segments. Ailes portant de courts poils noirs épars. Ventre noir à très courte pubescence noire.

Pattes d'un rouge brillant. Hanches noirâtres à longs poils concolores. cuisses noirâtres à extrémité apicale rouge, pubescence noire sur les parties sombres, rouge vers l'apex; tibias rouge clair à pubescence fauve, tarsi antérieurs noir rougeâtre à pubescence noire, tarsi médians et postérieurs rouges un peu rembrunis à l'apex par la pubescence noire du côté externe épaissie vers l'apex.

Ailes hyalines, bord costal et stigma jaune brun, extrême base brunâtre, nervures jaunes.

Balanciers et cuillerons noirâtres.

Cette variété de *Tabanus rufipes* Bal. Beauv. est voisine de *T. sanguinipes* Ricardo et s'en distingue par ses tibias rouges, sa coloration du thorax brun rouge et sa taille moindre.
